

KARTA PACJENTA

Szanowni Państwo!

Lekarz zalecił Państwu stosowanie leku Pradaxa® (eteksylan dabigatranu). Aby bezpiecznie stosować lek, proszę zapoznać się z istotnymi informacjami wewnątrz karty.

Dalsze informacje można uzyskać:

- pod numerem telefonu do firmy Boehringer Ingelheim Sp z o.o. **+48 518 021 995**
- na stronie internetowej www.boehringer-ingelheim.pl

**PROSZĘ DOPILNOWAĆ,
BY LEKARZ WYPEŁNIŁ
ODWROTNĄ STRONĘ KARTY**

Pradaxa®



Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 699 0 699, fax: (22) 699 0 698
www.boehringer-ingelheim.pl

Lek Pradaxa® – informacje dla pacjenta

- Podczas stosowania leku Pradaxa® należy przestrzegać zaleceń lekarza.
- Lek Pradaxa® zapobiega zakrzepom poprzez „rozrzedzenie” krwi. Może to jednak zwiększać ryzyko krwawienia.
- W przypadku krwawienia, które nie ustępuje samoistnie, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.
- Ponieważ lek Pradaxa® działa na układ krzepnięcia krwi, większość działań niepożądanych wiąże się z krwawieniem lub powstawaniem siniaków. Objawy krwawienia mogą obejmować powstawanie krwiaków w obrębie skóry, smoliste stolce, obecność krwi w moczu, krwawienia z nosa itp.
- Jeżeli planowany jest zabieg chirurgiczny lub inna procedura inwazyjna, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Pradaxa®.
- Nie należy przerywać stosowania leku Pradaxa® bez konsultacji z lekarzem, ponieważ powoduje to ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub innych powikłań związanych z tworzeniem się zakrzepów.
- W przypadku krwawienia należy skontaktować się z lekarzem przed odstawieniem leku Pradaxa®.
- Lek Pradaxa® należy przyjmować regularnie, zgodnie z zaleceniami, nie pomijając dawek.

Lek Pradaxa® – informacje dla pracowników opieki zdrowotnej

- Lek Pradaxa® (efeksylian dabigatranu) to doustny lek przeciwkrzepliwý działający poprzez bezpośrednie hamowanie trombiny, wydalany głównie przez nerki.
- W przypadku zabiegów chirurgicznych lub innych procedur inwazyjnych lek Pradaxa® należy odstawić z wyprzedzeniem (szczegółowe informacje zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego).
- W przypadku poważnego krwawienia lek Pradaxa® należy odstawić niezwłocznie.
- Ponieważ lek Pradaxa® jest wydalany głównie przez nerki, konieczne jest picie odpowiedniej ilości płynów.

Lek Pradaxa® może być usuwany w drodze dializy, choć dane kliniczne w tym zakresie są ograniczone (szczegółowe informacje oraz dalsze wskazówki dotyczące odwrócenia działania przeciwkrzepliwego leku Pradaxa® są zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

Dane pacjenta

Imię i nazwisko pacjenta

Data urodzenia

Wskazania do leczenia przeciwkrzepliwego

Dawkowanie leku Pradaxa®

Dane kontaktowe lekarza prowadzącego leczenie